

01. Leia o texto:

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” (Adaptado de: DROULERS, Martine. **Dictionnaire geopolitique des états**, 1995).

Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma terra de contrastes:

- a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e predomínio de atividades rurais.
- b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e tecnológicos para explorá-los.
- c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de Terceiro Mundo.
- d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão de fronteiras terrestres e de costa.
- e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal entre parênteses não completa corretamente a frase:

- a) _____ na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. (Existem).
- b) _____ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
- c) _____ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
- d) _____ elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
- e) _____ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. (Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:

- a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
- b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o autor do livro de Geografia.
- c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no motor.
- d) Este é o autor cuja leitura do livro de contos nós lhe recomendamos.
- e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:

- a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”

- d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por meio de drogas injetáveis.”
- e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....

..... com milhões de juízes.....

.... e nenhum réu!

A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.

Assinale a alternativa em que essa expressão “.....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de vista em relação aos usuários da internet:

- a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
- b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
- c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
- d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
- e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:

www.rionegrinho.gov.br/simbolos):

- a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
- b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
- c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
- d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
- e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:

- a) Gripe espanhola e câncer
- b) Peste negra e Covid 19
- c) Varíola e hipertensão
- d) Cólera e Colesterol
- e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:

- a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
- b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
- c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
- d) China, Índia, México e Indonésia.
- e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro de 1954 (Fonte: <https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia>):

- a) Jorge Zipperer
- b) Henrique Liebl
- c) Luiz Scholz
- d) José Brey
- e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos em (Fonte: www.quiriri.com.br):

- a) 28 de setembro de 1997.
- b) 17 de setembro de 1999.
- c) 06 de abril de 2005.
- d) 24 de outubro de 1995.
- e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. No atendimento inicial às gestantes, puérperas e recém-nascidos (RN) deve-se notificar imediatamente os casos suspeitos e os confirmados por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico para Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Na Unidade Básica de Saúde (UBS) o atendimento destinado a gestantes com suspeita ou confirmação para COVID-19 deve ser identificado e separado do atendimento de rotina, com entradas distintas. Considerando que as ações voltadas as gestantes, puérperas e recém-nascidos devem continuar sendo priorizadas, com atenção humanizada à gestação, ao parto e ao puerpério, bem como, à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudável.

A Nota Técnica nº 007/2021 - NAMCA/DAPS/SPS/SES que orientou sobre condutas para o atendimento da gestante, puérpera e recém-nascido frente à COVID-19, abordou sobre a realização do teste RT-qPCR em gestantes.

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA** sobre a realização do teste RT-qPCR em gestantes conforme Nota Técnica nº 007/2021:

- a) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 39ª a 40ª semanas de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
- b) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 34ª a 35ª semanas de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
- c) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 30ª a 34ª semanas de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
- d) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 37ª a 38ª semanas de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
- e) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR entre 32ª a 35ª semanas de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.

12. O descolamento prematuro de placenta (DPP) é a separação da placenta normalmente inserida, de forma parcial ou completa, antes do nascimento do feto. O diagnóstico, geralmente, é reservado para gestações com 20 ou mais semanas.

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA** com os achados clínicos principais de DPP:

- a) Os achados clínicos principais são perda de muco vaginal e contrações rítmicas, muitas vezes, acompanhados por contrações uterinas hipertônicas e um padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador.
- b) Os achados clínicos principais são perda de tampão vaginal e dor abdominal, muitas vezes, acompanhados por padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador.
- c) Os achados clínicos principais são sangramento vaginal, porém raramente acompanhados por contrações uterinas.
- d) Os achados clínicos principais são perda do tampão vaginal e contrações rítmicas, muitas vezes, acompanhados por contrações uterinas hipertônicas.
- e) Os achados clínicos principais são sangramento vaginal e dor abdominal, muitas vezes, acompanhados por contrações uterinas hipertônicas e um padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador.

13. Situação que se caracteriza pela existência de endométrio na intimidade do miométrio além de 2,5mm de profundidade ou no mínimo um campo microscópico de grande aumento distante da camada basal do endométrio circundado por hiperplasia das células musculares. Há pequenos lagos de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou como um nódulo circunscrito na parede miometrial. A invaginação do endométrio para a musculatura uterina leva a aumento volumétrico uterino e por vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade. A apresentação clínica da doença é variável assim como seu impacto sobre a vida da mulher (Fonte: <https://www.febrasgo.org.br>).

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA** que trata do termo para o conceito apresentado:

- a) Mioma
- b) Pólipo uterino
- c) Adenomiose
- d) Cervicite
- e) Endometriose

14. Em sua segunda edição, o Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera visa orientar o acesso e a horizontalidade da assistência durante a pandemia covid-19, abordando as vias de transmissão, o diagnóstico precoce e o adequado manejo das gestantes e puérperas nas diversas fases da infecção, definindo diretrizes que evitem a morbimortalidade materna e os agravos ao conceito. Também discute as vacinas contra a covid-19 para gestantes e puérperas.

Uma vez que a determinação da gravidade do estado da gestante pode ser desafiadora, é recomendado que os profissionais de saúde utilizem o Escore de Alerta Obstétrico Modificado (MEOWS), como ferramenta de apoio à decisão. Mulheres com dois ou mais sinais de alerta amarelo ou um ou mais sinais de alerta vermelho, assim como aquelas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), têm risco aumentado de evolução desfavorável e, portanto, merecem cuidado diferenciado.

Analise as descrições abaixo e assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta apenas sinais de risco amarelo, conforme Escore de Alerta Obstétrico Modificado (MEOWS):

- a) Frequência respiratória: 11-19; Temperatura: 36 °C - 37,4°C; Frequência cardíaca: 60-99;
- b) Frequência respiratória: 20-24; Temperatura: 35,1 °C - 35,9 °C ou 37,5 °C - 37,9 °C; Frequência cardíaca: 50-59 ou 100-119;
- c) Frequência respiratória: 15-19; Temperatura: 36 °C - 37,4°C; Frequência cardíaca: 50-59 ou 100-119;
- d) Frequência respiratória: 11-19; Temperatura: 35,1 °C - 35,9 °C ou 37,5 °C - 37,9 °C; Frequência cardíaca: 50-59 ou 100-119;
- e) Frequência respiratória: 20-24; Temperatura: 36 °C - 37,4°C; Frequência cardíaca: 60-99;

15. A Nota Técnica Conjunta nº001/2021 – DAPS/DIVE orienta sobre o diagnóstico, tratamento, monitoramento e notificação da sífilis adquirida, gestacional e congênita. A última atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde ocorreu em 2020. Conforme o protocolo, o Teste Rápido (TR) é o mais indicado para início do diagnóstico, pois é prático e de fácil execução, com resultados em, no máximo, 30 minutos. Tem a vantagem de poder ser realizado no momento da consulta, possibilitando tratamento imediato.

Sobre o protocolo, leia as afirmações a seguir:

I- Após TR reagente, iniciar a investigação com o teste não treponêmico. Se reagente e descartada a possibilidade de cicatriz sorológica, iniciar imediatamente o tratamento e a notificação.

II- A cicatriz sorológica é o fenômeno em que, após tratamento adequado e documentado, há ausência de negatização, mas ocorre a queda da titulação dos testes não treponêmicos em pelo menos duas diluições.

III- O(a) parceiro (a)(s) sexual(is) não precisa ser testado (a)(s) nem tratado (a)(s).

IV- A Benzilpenicilina Benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação. Pode ser feita com segurança na Unidade Básica de Saúde (UBS).

V- A ausência do médico na UBS não configura motivo para não realização da administração oportuna de Penicilina Benzatina por profissionais de enfermagem.

Assinale a opção **CORRETA** conforme a Nota Técnica Conjunta nº001/2021 – DAPS/DIVE:

- a) Estão corretas somente as alternativas I, II, IV e V
- b) Estão corretas somente as alternativas I, IV e V
- c) Estão corretas somente as alternativas I, II e IV
- d) Estão corretas somente as alternativas I e IV
- e) Todas as alternativas estão corretas.

16. Infecções do trato urinário (ITUs) correspondem à presença de microorganismos patogênicos nas vias urinárias inferiores ou superiores. São frequentemente consideradas um dos subtipos mais comuns de infecção bacteriana em humanos. Tais infecções podem acometer o trato urinário baixo, manifestando-se como uretrites e cistites, ou alto, manifestando-se como pielonefrites. As ITUs são mais frequentes nas mulheres, em comparação aos homens, e se estima que cerca de metade das mulheres terão ao menos um episódio de ITU ao longo da vida. A gestação se associa a uma maior estase de urina no trato genital inferior e superior, seja por dificuldades de esvaziamento associadas à compressão pelo útero gravídico, seja pelo peristaltismo ureteral reduzido e leve dilatação ureteral observado durante a gestação. Essa tendência a estase perturba um dos mecanismos de proteção do trato urinário contra a aderência e invasão bacterianas – o fluxo de urina e esvaziamento miccional, que acaba levando a descamação de células superficiais e a eliminação de bactérias eventualmente aderidas. Tais modificações aumentam a prevalência de bacteriúria assintomática, pielonefrite e quadros recorrentes de ITU durante a gravidez.

(Fonte: <https://www.febrasgo.org.br>).

O protocolo da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina para Assistência à Infecção do Trato Urinário na Gestação, publicado em agosto de 2018, aponta ações para rastreamento no pré-natal. Sobre essas ações recomendadas no protocolo, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Gestantes sintomáticas: coletar urocultura e iniciar tratamento presumido imediatamente após a coleta. Nesse caso essas pacientes precisam ter prioridade na marcação do exame.
- () Urinálise no primeiro e terceiro trimestre de gestação
- () Urocultura (com antibiograma) no primeiro e terceiro trimestre de gestação
- () Controle: urocultura negativa colhida 7 a 10 dias após o término do tratamento;

A respeito das afirmações, assinale a opção com a sequência **CORRETA**:

- a) F, V, V, F
- b) V, F, F, F
- c) V, V, V, V
- d) V, V, F, F
- e) V, V, V, F

17. O parto prematuro é um dos maiores desafios obstétricos na atualidade, apresentando altas taxas de morbimortalidade perinatal. As causas do parto prematuro não estão bem definidas. Porém, certos quadros clínicos podem torná-lo mais provável. Na anamnese deve-se avaliar fatores de risco (fisiológicos, comportamentais e psicossociais), problemas na gravidez atual, complicações clínicas associadas e estado fetal.

Sobre as possíveis causas de Trabalho de Parto Prematuro (TPP) no Manual Técnico de Gestão de Alto Risco do MS, leia as situações a seguir:

- I- Parto prematuro prévio;
- II- Atividade física aumentada;
- III- Crescimento intrauterino restrito
- IV- Colo uterino com mais de 25mm de comprimento

V- Presença de DIU

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA** com fatores de risco que podem estar associados ao nascimento prematuro, conforme Manual Técnico:

- a) Estão corretas somente as alternativas I e III
- b) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e V
- c) Estão corretas somente as alternativas I, III, IV e V
- d) Estão corretas somente as alternativas I, II e III
- e) Todas as alternativas estão corretas

18. De acordo com o Algoritmo de suporte para PCR na gravidez nos Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), como as pacientes grávidas são mais propensas à hipóxia, a oxigenação e o manejo da via aérea devem ser priorizados durante a ressuscitação de uma PCR durante a gravidez.

Segundo o algoritmo, em caso de via aérea avançada na gestante, mesmo em ambiente extra-hospitalar, sobre a frequência de ventilações e compressões, assinale abaixo a alternativa **CORRETA**:

- a) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 3 segundos (20 ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.
- b) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 4 segundos (15 ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.
- c) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 3 segundos (20 ventilações/minuto) intercalando com 30 compressões torácicas.
- d) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/minuto) intercalando com 30 compressões torácicas.
- e) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.

19. Existem várias classificações descritas para os distúrbios hipertensivos na gravidez. Em 2013, a International Society for the Study in Hypertension and Pregnancy (ISSHP) revisou a classificação dos distúrbios hipertensivos na gestação.

Conforme Manual da Série Orientações, Recomendações da Febrasgo, relacione abaixo cada termo a sua definição:

- A- Hipertensão arterial crônica
- B- Hipertensão gestacional
- C- Pré-eclâmpsia
- D- Hipertensão do avental branco

- () É o ressurgimento ou agravamento da hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação.
- () É a hipertensão arterial que surge pela primeira vez após a 20ª semana da gestação, sem estar acompanhada de nenhum sinal, sintoma ou alteração laboratorial que caracterize a PE.
- () É a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica precedendo a gestação. Como muitas vezes não há registros de medidas de PA antes da gestação, considera-se quando é constatada no 1º trimestre da gestação ou, no máximo, até a 20ª semana.
- () Cerca de 25% das pessoas que apresentam medidas aumentadas de PA no consultório. O diagnóstico pode ser confirmado por medidas seriadas ou por monitorização ambulatorial da PA. Há poucos estudos sobre a repercussão deste tipo de distúrbios na gestação, alguns apontando que em até 50% destes casos haja evolução.

Assinale a alternativa que representa a sequência **CORRETA**:

- a) C, B, A, D
- b) C, A, B, D
- c) B, A, C, D

- d) B, C, A, D
- e) A, B, C, D

20. Conforme Manual de Orientação Trato Genital Inferior da Febrasgo, leia a definição a seguir:

_____ é uma dermatose inflamatória crônica e benigna com predominante localização vulvar. Embora pouco frequente, pela sintomatologia molesta, necessita de diagnóstico e tratamento eficazes. Afeta tanto a epiderme quanto a derme predominando na região genital feminina, sendo a relação aproximada de dez mulheres para um homem acometido. Acomete mais a faixa etária da mulher adulta e principalmente no período pós menopausal. Caracteriza-se pela presença do prurido vulvar associado com o aparecimento de pápulas branco-nacaradas, que podem agrupar-se e assumir progressivamente aspecto apergaminado na pele.

Assinale a alternativa abaixo que completa **CORRETAMENTE** o nome do termo na lacuna no conceito anterior:

- a) Líquen Escleroso e Atrófico
- b) Dermatites vulvares
- c) Condiloma
- d) Herpes genital
- e) Vulvovaginites